

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 31-7-75072053

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION "CENTRE"

(CHER, INDRE, LOIRET, LOIR-ET-CHER, INDRE-ET-LOIRE, EURE-ET-LOIR)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

93, rue de Curambourg - 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS

Téléphone : 86-36-24

ABONNEMENT ANNUEL : 50 F

M. le Sous-Régisseur de recettes
de la Protection des Végétaux
93, RUE DE CURAMBOURG
45400 FLEURY-LES-AUBRAIS
C. C. P. : La Source 4604-25

BULLETIN TECHNIQUE N° 68

28 JUILLET 1975

MILDIOU DE LA VIGNE

VIGNES

L'état sanitaire des vignes est en général satisfaisant. Toutefois, dans certaines situations, notamment dans l'Indre et Loire et le Loir et Cher, quelques nouvelles taches sont apparues depuis le dernier traitement conseillé dans nos bulletins des 7 et 9 Juillet.

En conséquence, dans toutes les vignes où des taches sont apparues et dans les parcelles voisines, un traitement, qui sera sans doute le dernier, devra être appliqué 5 à 7 jours après les prochaines pluies.

Dans les autres situations, il est préférable d'attendre l'apparition des premières taches pour intervenir. Pour ce dernier traitement, dit d'aoûtement, il est conseillé d'utiliser un produit cuprique ou organo-cuprique et de soigner particulièrement la pulvérisation.

BLACK ROT DE LA VIGNE

Afin d'éviter des attaques sur grappes à partir des taches qui peuvent exister sur les feuilles, il est obligatoire d'effectuer un traitement sur toutes les vignes situées dans les communes déclarées contaminées par arrêté préfectoral.

OIDIUM DE LA VIGNE

Les indications données dans nos précédents bulletins restent toujours valables. Des attaques sur grappes sont parfois visibles dans certaines vignes sensibles.

Il y a donc lieu d'être très attentif afin d'intervenir le cas échéant par poudrage de préférence. Ce traitement peut être éventuellement conjugué avec celui dirigé contre les vers de la grappe.

VERS DE LA GRAPPE

Le deuxième vol d'Eudémis et de Cochylis se poursuit. Il semble particulièrement important en Indre et Loire et dans le Loir et Cher. Les premiers oeufs déposés arrivent maintenant à éclosion.

Les attaques risquent d'être dangereuses surtout dans les situations où des dégâts ont été observés au cours de la première génération. En conséquence, il est conseillé d'effectuer un traitement dès réception de ce bulletin.

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES

ARBRES FRUITIERS

La sortie des premiers papillons du deuxième vol est imminente et un prochain bulletin précisera la date d'intervention contre la deuxième génération.

Dans tous les vergers où aucune attaque, ancienne ou récente, n'a été observée jusqu'au 20 Juillet, le deuxième vol doit être inexistant (voir à ce sujet notre Bulletin n° 20 de Juin 1974).

Avant de décider de supprimer les traitements contre cette deuxième génération, il est nécessaire de vérifier par des sondages soignés qu'aucun dégât n'a été causé jusqu'à cette date et que les risques de voisinage constitués par les vergers insuffisamment protégés sont nuls.

PSYLLES DU POIRIER

On observe actuellement une activité importante de ces ravageurs. Dans certains vergers, les pontes et les adultes sont très nombreux.

Il est donc nécessaire d'être particulièrement vigilant afin de pouvoir intervenir rapidement dès que l'on observe la présence de jeunes larves (voir les Bulletins des 15 et 26 Mai).

ACARIENS - PUCERON LANIGERE

On observe actuellement une augmentation des populations d'acariens et une activité parfois importante du puceron lanigère. Il est donc nécessaire de surveiller attentivement les vergers afin d'intervenir éventuellement contre ces ravageurs.

TAVELURES DU POMMIER ET DU POIRIER

Nous rappelons les indications données dans notre bulletin du 1er Juillet.

Dans tous les vergers où la maladie est présente, la protection devra être assurée jusqu'à la récolte en fonction du grossissement des fruits et de l'abondance des pluies.

Dans les autres vergers, il est prudent de profiter des traitements dirigés contre le carpocapse ou d'autres ravageurs pour ajouter un fongicide efficace contre les tavelures.

MILDIOU DU TABAC

TABAC

Depuis notre Bulletin du 18 Juillet un nouveau foyer de la maladie a été découvert sur la commune de Loché sur Indrois (37). Il y a donc lieu de tenir compte des indications données dans notre Bulletin du 7 Juillet.

TEIGNE DU POIREAU

CULTURES MARAÎCHERES

Un nouveau traitement est conseillé contre ce ravageur.

Les Ingénieurs chargés des
Avertissements Agricoles

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie
Chef de la Circonscription phytosanitaire "CENTRE"

G. RIBAUT

B. LELIEVRE

G. BENAS